

Fecha del Procedimiento _____

DIRECCIÓN :

1650 Grand Concourse, Tercer Piso. Suite de Endoscopia, BronxCare Hospital Center, Bronx, New York 10457



Preparación para la colonoscopia

1. Llene el recipiente de solución de PEG con **agua hasta la línea** y colóquelo en el refrigerador Para que se enfríe antes de comenzar a beber.
2. Beberás una taza de 8 oz cada 10-15 minutos.
3. Si siente náuseas, deténgase por un tiempo y luego comience a beber nuevamente.
4. Beba Soda Ginger Ale si tiene náuseas.

Asegúrese de beber la **solución de preparación completa.**

Día antes de la colonoscopia

Paso 1: _____ **PM:** Tome las 4 tabletas de Bisacodyl con 2 Vasos de 8 oz de agua

Paso 2: _____ **PM :** Beber _____ litros de la mezcla de solución de Golytely

Día del Procedimiento:

Paso 3: _____ **AM:** Comience a beber el resto de _____ litros de la mezcla de solución de Golytely.

La última bebida debe ser 3 horas antes de la hora del procedimiento.

Medicamento:

- ✓ Tome su medicamento para la presión arterial con un sorbo de agua por la mañana.
- ✓ Use sus inhaladores regularmente 2 días antes y tome una dosis antes de su cita.
- ✓ Mantenga sus pastillas para diabéticos.
- ✓ Tome la mitad de la dosis de insulina de la mañana. (Insulin Glargine, Lantus, Basaglar)

Importante:

- ❖ La dieta comienza desde el día de la mañana antes de la colonoscopia.
- ❖ El laxante no puede lavar los alimentos sólidos.
- ❖ La mala preparación dificulta el examen del colon debido a las heces.
- ❖ Una mala preparación requiere repetir la colonoscopia.
- ❖ Después del procedimiento, necesitará un acompañante o un adulto responsable que lo acompañe de regreso del hospital.
- ❖ No podrá conducir un automóvil ni regresar al trabajo después de la prueba.
- ❖ Programe un día libre del trabajo el día de su procedimiento de colonoscopia.