

Cápsula Endoscópica Preparación

Por favor, siga las instrucciones a continuación:

1. No coma ni beba nada después de la medianoche.
2. Se le dará la prescripción de Golytely / HalfLyte - por favor complete este medicamento en la noche anterior antes de las 6 pm del día anterior.
3. Use ropa cómoda - dos capas - una capa fina de interior y una capa exterior.
4. Llegue a la oficina a las 7:30 AM en punto.
5. Se le tragar una cápsula que contiene la cámara de vídeo - esta cápsula tendrá varias imágenes de su intestino Delgado.
6. También va a usar un cinturón del monitor de su cintura por 7-8 ó 12 horas.
7. Usted puede hacer actividades livianas mientras usa el cinturón, pero no hay actividades extenuantes está permitido.
8. Después de aproximadamente 4 horas -. Puede tomar líquidos claros para beber
9. Debe devolver el monitor y el cinturón a la oficina al final de la prueba que será a las 3:00 o 4:00 de la tarde el mismo día.
10. No debe tener MRI examen - durante al menos 3-4 semanas. Si necesita un examen de resonancia magnética después de que la cápsula endoscópica - por favor consulte a su médico y ellos serán capaces de decidir cuándo será seguro para que se someta a la prueba de resonancia magnética. Esto puede ser determinado por un examen de rayos X del abdomen - si la cápsula ha pasado, es seguro hacerlo MRI.